

## **BAB V**

### **KESIMPILAN DAN SARAN**

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tahun 2013-2014 di RSUD Panembahan Senopati Bantul Yogyakarta, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kejadian *preeklamsi* pada ibu hamil dari 109 responden yang mengalami *preeklamsi* pada *primigravida* sebanyak 58 responden (53,2%) dengan *preeklamsi* ringan 14 responden (12,8%) dan *preeklamsi* berat 44 responden (40,4%)
2. Kejadian *preeklamsi* pada ibu hamil dari 109 responden yang mengalami *preeklamsi* pada *multigravida* sebanyak 49 responden (45,0%) dengan 10 responden (9,2%) *preeklamsi* ringan dan *preeklamsi* berat 39 (35,8%)
3. Kejadian *preeklamsi* pada ibu hamil dari 109 responden yang mengalami *preeklamsi* pada *grandemultigravida* dua responden (1,8%) dengan *preeklamsi* berat

#### B. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan mengenali faktor lain yang berhubungan dengan kejadian *preeklamsi* pada ibu hamil sehingga hasilnya dapat dijadikan masukan dalam upaya penurunan *preeklamsi*

2. Bagi Mahasiswa

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang kejadian *preeklamsi* kepada mahasiswa, sehingga diharapkan mahasiswa dapat mengembangkan ilmu kejadian *preeklamsi*.

3. Bagi institusi pelayanan kesehatan

Tenaga kesehatan diharapkan dapat membangkitkan motivasi ibu hamil dengan memberikan pendidikan kesehatan yang relevan untuk pencegahan *preeklamsi* berat berupa bagaimana menjaga kesehatan dengan diet yang ditentukan, kecukupan istirahat, keteraturan minum obat yang diberikan dan bagaimana menepati jadwal pemeriksaan ANC selanjutnya.