

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan usia kehamilan dengan kejadian ikterus neonatorum di RSUD Wates Yogyakarta. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis pada penelitian ini diterima dengan data sebagai berikut:

1. Sebagian besar responden rata—rata usia kehamilan ibu yang melahirkan di RSUD Wates Yogyakarta memiliki usia kehamilan cukup bulan yaitu sebesar 55 (76,4%) responden mempunyai usia kehamilan cukup bulan.
2. Pada penelitian ini sebagian besar responden tidak mengalami ikterus sebanyak 40 (55,6%), sedangkan yang mengalami ikterus sebanyak 32 (44,4) responden
3. Ada hubungan yang signifikan antara variabel usia kehamilan dengan variabel ikterus neonatorum dengan nilai $p_{value} 0,002 < 0,05$, dengan keeratan hubungan sebesar 0,337 (rendah).

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi bidan dan perawat RSUD Wates Yogyakarta
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan agar petugas kesehatan mampu melakukanantisipasi dan deteksi dini pada bayi baru lahir yang bermasalah untuk mencegah terjadinya ikterus neonatorum.
2. Bagi ibu hamil dan postpartum hendaknya meningkatkan pengetahuan tentang ikterus neonatorum fisiologis karena usia kehamilan.

3. Bagi Peneliti selanjutnya

Diharapkan bagi peneliti lain dapat dijadikan bahan acuan untuk meneliti dan menggali faktor-faktor yang mempengaruhi usia kehamilan dengan kejadian ikterus neonatorum.

4. Bagi peneliti

Dapat menjadikan penelitian ini sebagai tambahan ilmu pengetahuan yang kemudian dapat ditindak lanjuti dengan penelitian lain.

PERPUSTAKAAN
JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA