

INTISARI

Latar Belakang : Salah satu penyebab kematian ibu sebagian besar disebabkan oleh kasus perdarahan selama masa nifas yang terjadi karena retensio placenta. Dibandingkan dengan resiko-resiko lain dari ibu bersalin, perdarahan post partum dimana retensio placenta salah satu penyebabnya dapat mengancam jiwa dimana ibu dengan perdarahan yang hebat akan cepat meninggal jika tidak mendapat perawatan medis yang tepat.

Tujuan : Mengetahui karakteristik penyebab retensio placenta karena faktor grandemultipara dan karakteristik penyebab retensio placenta karena faktor umur.

Metode : Penelitian ini merupakan jenis penelitian observasional dengan rancangan retrospektif. Penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif kuantitatif, pengambilan sampel dengan metode *purposive sampling*. Besar sampel 306 ibu bersalin sesuai kriteria inklusi dan eksklusi. Data-data tersebut dianalisa dengan menggunakan *distribution form*.

Kesimpulan : Retensio placenta lebih banyak terjadi pada grandemultipara yakni lebih dari 5 orang sebesar 96,3% dan juga lebih sering terjadi pada umur lebih dari 35 tahun sebesar 54,5%. Oleh karena itu dalam penanganan ibu bersalin karakteristik penyebab kejadian retensio placenta yakni umur dan grandemultipara harus diperhatikan oleh tenaga medis.

Kata Kunci : Ibu Bersalin, Kematian dan Retensio Placenta.

ABSTRACT

Background: One of the causes of maternal deaths are mostly caused by bleeding cases during the postpartum period due to retained placenta. Compared with other risks of maternal, postpartum hemorrhage which retained placenta can cause one where mothers with life-threatening massive bleeding will quickly die if not get proper medical care.

Objective: To determine the characteristics of the causes of retained placenta because grandemultipara factors and characteristics of retained placenta causes due to age factor.

Methods: This study is a type of observational study with a retrospective design. The study was conducted by quantitative descriptive approach, sampling with *purposive sampling method*. 306 maternal sample size appropriate inclusion and exclusion criteria. The data was analyzed using distrution form method.

Conclusion: retained placenta occurs more frequently in grandemultipara ie more than 5 people at 96.3% and is also more common in the age over 35 years at 54.5%. Therefore, in the handling characteristics of the maternal placenta retained the cause of the incident and grandemultipara age must be considered by medical personnel.

Keywords: Mother Maternity, Mortality and retained placenta.