

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sebagian besar responden yang menggunakan KB suntik 3 bulan adalah responden yang berumur 20-35 tahun yaitu sebanyak 24 responden (68,6%), berpendidikan menengah sebanyak 19 responden (54,3%), tidak bekerja sebanyak 20 responden (57,1%) dan memakai KB suntik 3 bulan selama 2-3 tahun sebanyak 18 responden (51,4%).
2. Sebagian besar responden yang menggunakan KB suntik 3 bulan mengalami gangguan menstruasi berupa menstruasi yang sedikit (71,4%).
3. Sebagian besar responden memiliki pola haid tidak teratur (62,9%).
4. Sebagian besar responden memiliki pengetahuan tentang gangguan menstruasi pada kategori cukup (42,9%)

B. Saran

1. Bagi Institusi Stikes Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
Perlunya menambah referensi di perpustakaan lebih lengkap mengenai KB suntik 3 bulan sehingga dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya bagi mahasiswa.

2. Bagi Klinik Pratama Bina Sehat Kasihan Bantul

Sebagai masukan untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat sekitar Klinik terutama penyuluhan mengenai gangguan menstruasi pada akseptor KB suntik 3 bulan sehingga masyarakat terutama akseptor KB dapat mengikuti program KB tanpa merasa khawatir akan efek samping yang dirasakan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam melakukan penelitian yang sama mengenai gangguan menstruasi pada akseptor KB suntik 3 bulan, sehingga hasil yang diperoleh akan semakin luas.

PERPUSTAKAAN
JENDERAL ACHMAD YANI
STIKES JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA