

## PERAWATAN LUKA PERINEUM OLEH IBU NIFAS DI RUMAH

Arima Fitriyani <sup>1</sup>, Wenny Savitri <sup>2</sup>.

### INTISARI

**Latar Belakang** : Pada Puskesmas Muntilan II diperoleh data ibu nifas dalam 6 bulan terakhir terdapat 3 orang terkena infeksi pada luka perineumnya. Dari 3 orang yang terkena infeksi perineum, ketiganya melakukan perawatan perineum dengan tidak mencucinya menggunakan sabun karena masih takut melukai jahitan perineumnya sehingga jahitan yang basah, kemerahan, serta sedikit bengkak. Ibu nifas merasa takut dan enggan untuk melakukan *miksi* dan *defekasi* dengan alasan rasa nyeri pada luka jahitan pada perineumnya serta takut akan terjadi infeksi pada luka tersebut.

**Tujuan Penelitian** : Untuk mengetahui perilaku perawatan luka perineum pada ibu nifas primipara

**Metode Penelitian** : menggunakan rancangan deskriptif non analitik dengan pendekatan *kuantitatif* dengan subjek semua ibu nifas primipara dengan convenience sampling.

**Hasil Penelitian** : berdasarkan analisis yang dilakukan terdapat 24 responden ( 75,0%) melakukan perawatan luka perineum dengan baik. Terdapat 31 orang atau 96,9% ibu nifas yang telah melakukan perawatan luka perineum pada tahap persiapan dengan baik. 27 orang atau 84,4% ibu nifas yang telah melakukan perawatan luka perineum pada tahap kerja dengan baik, 30 orang atau 93,8% ibu nifas yang telah melakukan perawatan luka perineum pada tahap terminasi dengan baik.

**Kesimpulan** : Perilaku ibu *postpartum primipara* tentang perawatan luka perineum dikategorikan baik.

Kata Kunci : Perilaku, *Postpartum*, *Primipara*, Perawatan luka perineum.

---

<sup>1</sup> Mahasiswi Diploma III Kebidanan STIKES A Yani Yogyakarta

<sup>2</sup> Dosen STIKES Ahmad Yani Yogyakarta

## THE ATTITUDES OF THE PUERPERAL MOTHERS IN PERINEUM WOUND TREATMENT

Arima Fitriyani <sup>1, 2</sup> Wenny Savitri.

### ABSTRACT

**Background:** In the PKM Muntilan II, between 6 last months it was found 3 perineum infection cases. There were patients did the wound perineum treatment with not wash their perineum use soap because afraid torn perineum tear so there were some wet, red and swollen stitches. The puerperal mothers are afraid and reluctant to conduct miksi and defecation treatments because of painful reason of stitch wound on perineum. The puerperal mothers are also afraid of infection that will occur on the wound.

**Objective:** to find out attitudes of the puerperal mothers in treating perineum wound

**Methods:** Using a descriptive method with approaches Survey, using convenience sampling method with the subject of all puerperal mothers with perineum tear that occur during delivery. The total sample of 32 people, the data collection techniques used are checklist.

**Result:** the attitudes of puerperal mothers on the wounds perineum treatments in the Muntilan II Community Health Center included in both categories as many as 24 respondent (75,0%), the attitudes of puerperal mothers on the wounds perineum treatments in the pra interaction phase included in both categories, the number of those 31 respondents (96.9%), the attitudes of puerperal mothers on the wounds perineum treatments in the work phase included in both categories, with the number of respondents 27 individuals (84,4%), the attitudes of puerperal mothers on the wounds perineum treatments in the termination phase included in both categories, with the number of respondents 30 (93,8%).

**Conclusion:** the attitudes of puerperal mothers on the wounds perineum treatments in the Muntilan II Community Health Center included in both categories

**Keywords:** the attitudes, puerperal mothers , the wounds perineum treatments

---

Midwifery Diploma student <sup>1</sup> STIKES A Yani Yogyakarta

<sup>2</sup> STIKES Lecturer Ahmad Yani Yogyakarta