

HUBUNGAN METODE PERSALINAN DENGAN IKTERUS NEONATORUM DI RSUD WATES YOGYAKARTA TAHUN 2016

INTISARI

Dewi Wisra¹, Ida Nursanti², Yuni Very Anto³

Latar Belakang: Ikterus neonatorum sebagian besar merupakan ikterus fisiologis. Akan tetapi, bila tidak segera ditangani dengan baik akan menimbulkan cacat seumur hidup, atau bahkan kematian. Faktor yang mempengaruhi terjadinya ikterus pada bayi adalah metode persalinan yang dipilih oleh ibu bersalin. Bayi yang lahir dengan tindakan juga tidak memperoleh bakteri-bakteri menguntungkan yang terdapat pada jalan lahir ibu yang berpengaruh pada pematangan sistem daya tahan tubuh, sehingga bayi lebih mudah terinfeksi.

Tujuan: Diketuinya hubungan antara metode persalinan dengan ikterus neonatorum di RSUD Wates Yogyakarta.

Metode: Jenis penelitian ini adalah penelitian survey analitik dengan menggunakan rancangan *cohort retrospektif*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu bersalin yang melakukan persalinan di RSUD Wates Yogyakarta. Teknik pengambilan menggunakan *purposive sampling*. Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah lembar observasi. Analisa data yang digunakan adalah analisa univariat dan analisa bivariat.

Hasil: Sebagian besar responden melakukan persalinan dengan normal (60,9%). Sebagian besar responden memiliki bayi yang mengalami ikterus (54,7%). Hipotesa diterima yaitu adanya hubungan antara metode persalinan dengan ikterus neonatorum di RSUD Wates Yogyakarta dengan nilai *p-value* sebesar 0,041.

Kesimpulan: Jenis persalinan dapat berpengaruh terhadap kejadian ikterus sehingga perlu dilakukan pemberian konseling pada ibu hamil agar lebih matang dalam mengambil tindakan persalinan yang akan dilakukan sehingga dapat mengurangi insiden ikterus pada bayi.

Kata Kunci: Metode Persalinan, Ikterus Neonatorum

¹ Mahasiswa Program studi ilmu keperawatan Stikes Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

² Dosen Program studi ilmu keperawatan Stikes Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

³ Dosen Program studi ilmu keperawatan Stikes Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

**CORRELATION METHOD DELIVERY BY JAUNDICE NEONATORUM
AT RSUD WATES YOGYAKARTA
2016**

ABSTRACT

Dewi Wisra¹, Ida Nursanti², Yuni Very Anto³

Background: jaundice neonatorum is largely jaundice physiological. However, if not immediately treated well will cause defect a lifetime, or even death. Of factors affect the jaundice in infants is the method deliveries chosen by mother delivery. An infant born with the act of also have no are bacterium a beneficial are on jl born mother that affects maturation system endurance, so babies easier infected.

Objective: To knew the correlation between a method of labor with jaundice neonatorum at rsud wates yogyakarta.

Method: type this research is research survey analytic by using design cohort retrospective. Population in research it is a whole mother maternity who performs childbirth at rsud wates yogyakarta. Technique purposive the use of sampling. An instrument used in research is sheets of observation. Analysis the data used was analysis univariat and analysis of bivariat.

Result: the majority of respondents do labor with normal (60,9%). The majority of respondents have babies that experienced jaundice (54.7%). Is hypothesized accepted that is the correlation between a method of labor with jaundice neonatorum at rsud wates yogyakarta with the p-value of 0,041.

Conclusion: type childbirth can influential to events jaundice so that needs to be done providing counseling for pregnant women to be more matured in take action deliveries will be done so as to diminish the incident jaundice in infants.

Keywords: method childbirth, jaundice neonatorum

¹ Students of Nursing Science Study Program Stikes Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

² Lecturer of Nursing Science Study Program Stikes Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

³ Lecturer of Nursing Science Study Program Stikes Jenderal Achmad Yani Yogyakarta