

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di BLUD Kota Salatiga, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mayoritas responden mengalami kala II normal sebanyak 341 (74,6%) dan minoritas mengalami kala II lama sebanyak 116 (25,4%)
2. Mayoritas responden bayinya tidak mengalami asfiksia yaitu sebanyak 378 bayi (82,7%), dan minoritas mengalami asfiksia yaitu sebanyak 17,3% atau sejumlah 79 bayi pada ibu dengan persalinan kala II lama.
3. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa ibu bersalin yang mengalami kala II lama yang bayinya mengalami asfiksia sebanyak 79 ibu, sedangkan yang tidak mengalami asfiksia sebanyak 37 bayi. Pada hasil analisis dengan uji *chi square* didapatkan nilai p sebesar $0,000 <$ dari α 0,05, berarti terdapat hubungan yang signifikan antara persalinan kala II lama dengan kejadian bayi asfiksia di BLUD Kota Salatiga selama tahun 2009.



B. Saran

1. Bagi tenaga kesehatan khususnya bidan di BLUD Kota Salatiga

Diharapkan bidan dapat segera melakukan tindakan penanganan terhadap bayi yang mengalami asfiksia sehingga dapat menurunkan angka kematian bayi dan penting untuk melakukan pencegahan terjadinya asfiksia neonatorum.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Hendaknya peneliti melakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan metode yang berbeda terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya asfiksia.

3. Bagi ilmu pengetahuan

Dapat dijadikan sebagai tambahan materi dan informasi mengenai asfiksia, sehingga asfiksia dapat dicegah atau dikurangi.

4. Bagi institusi pendidikan

Dapat dijadikan sebagai tambahan referensi tentang kala II dan asfiksia.

5. Bagi masyarakat

Masyarakat perlu untuk mengetahui penyebab asfiksia, sehingga dapat melakukan tindakan yang tepat untuk menyelamatkan nyawa bayi.

