

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tingkat pengetahuan tentang efek samping KB suntik 3 bulan mengenai gangguan haid yang dialami responden sebagian besar adalah cukup yaitu 21 responden atau 60,0%.
2. Tingkat pengetahuan tentang efek samping KB suntik 3 bulan mengenai perubahan berat badan yang dialami responden sebagian besar adalah cukup yaitu 17 responden atau 48,6%.
3. Tingkat pengetahuan tentang efek samping KB suntik 3 bulan mengenai keputihan yang dialami responden sebagian besar adalah cukup yaitu 24 responden atau 68,6%.
4. Tingkat pengetahuan tentang efek samping KB suntik 3 bulan mengenai pusing atau sakit kepala yang dialami responden sebagian besar adalah cukup yaitu 22 responden atau 62,9%.
5. Tingkat pengetahuan ibu tentang efek samping KB Suntik 3 Bulan di Puskesmas Sewon 1 Bantul Yogyakarta Tahun 2016 sebagian besar adalah cukup yaitu 30 responden atau 85,78%.

B. Saran

1. Bagi Pukesmas

Bidan perlu meningkatkan dalam memberikan penyuluhan secara komprehensif khususnya pada akseptor KB suntik baru maupun lama tentang

efek samping KB suntik 3 bulan, supaya para akseptor KB lebih tau dan jeli terhadap efek samping KB suntik 3 bulan tersebut.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat mengembangkan dan dapat melakukan penelitian dengan menambah variabel agar memperoleh hasil yang lebih baik dan diharapkan dalam melakukan penelitian tidak pada satu tempat saja, sehingga responden didapatkan akan lebih bervariasi dan lebih menarik.

PERPUSTAKAAN
JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA