

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Distribusi Frekuensi Faktor Penyebab Kejadian Asfiksia Pada Bayi Baru Lahir di RS PKU Muhammadiyah Bantul Yogyakarta tahun 2014-2016.

Berdasarkan hasil penelitian kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Distribusi frekuensi faktor penyebab kejadian *asfiksia* pada bayi baru lahir berdasarkan faktor ibu yaitu mayoritas terjadi pada usia ibu 20-35 tahun sebanyak 16 (51,6%), , *paritas multipara* 10 (32,3%), umur kehamilan 37-42 minggu 18 (58,1%).
2. Distribusi frekuensi faktor penyebab kejadian *asfiksia* pada bayi baru lahir berdasarkan faktor dari bayi yaitu mayoritas terjadi pada berat lahir bayi >2500 gram sebanyak 12 (38,7%), dan jenis persalinan yang mengalami asfiksia pada persalinan normal sebanyak 10 (32,3%).

B. Saran

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan, khususnya bagi mahasiswa program studi D-3 Kebidanan.

2. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi RS PKU Muhammadiyah Bantul serta sektor terkait untuk promosi kesehatan kepada masyarakat tentang faktor penyebab kejadian asfiksia pada bayi baru lahir.

PERPUSTAKAAN
STIKES JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA