

ASUHAN BERKESINAMBUNGAN PADA NY. Y UMUR 31 TAHUN MULTIGRAVIDA DI PMB RINI WIDYANINGRUM KASIHAN BANTUL

Adinda Amalia Andriani Alpiah¹, Nendhi Wahyunia Utami²

RINGKASAN

Latar Belakang: Kehamilan dengan resiko tinggi adalah kehamilan yang dapat menimbulkan dampak pada ibu hamil dan bayi menjadi sakit dan bahkan meninggal sebelum kelahiran terjadi, salah satunya yakni jarak kehamilan yang terlalu jauh. Jarak kehamilan terlalu jauh dapat beresiko terhadap persalinan dengan kala I lama, ketuban pecah dini (KPD), dll. Selain itu, semakin besar usia kehamilan tubuh akan berusaha beradaptasi dengan maksimal terhadap perubahan terjadi sehingga sangat memungkinkan terjadinya ketidaknyamanan pada masa ini. *Continuity Of Care* (COC) merupakan langkah awal mendeteksi masalah dan melaksanakan asuhan sesuai kebutuhan klien. Oleh karena itu penting bagi penulis untuk memberikan asuhan secara berkesinambungan pada Ny. Y, seorang multigravida dengan jarak kehamilan 10 tahun dan ketidaknyamanan guna mendeteksi secara dini dan memberikan asuhan sesuai dengan standar pelayanan kebidanan.

Tujuan: Memberikan asuhan kebidanan secara berkesinambungan atau *Continuity of Care* (COC) pada ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir sesuai dengan manajemen kebidanan.

Hasil: Jarak kehamilan yang terlalu jauh pada Ny.Y mengakibatkan persalinan kala I lama sehingga dilakukan tindakan *sectio caesarea* (SC) untuk mencegah terjadinya kesakitan dan kematian baik pada ibu maupun bayi.

Kesimpulan: Asuhan Kebidanan berkesinambungan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan kebidanan.

Kata Kunci: Asuhan Berkesinambungan, Pelayanan Komplementer, Multigravida, Kebidanan.

¹ Mahasiswa Pendidikan Profesi Bidan Universitas Jendral Achamd Yani Yogyakarta

² Dosen Pendidikan Profesi Bidan Universitas Jendral Achamd Yani Yogyakarta

**CONTINUITY OF CARE FOR MRS. Y, 31 YEARS OLD, MULTIGRAVIDA
AT PMB RINI WIDYANINGRUM, KASIHAN, BANTUL**

Adinda Amalia Andriani Alpia¹, Nendhi Wahyunia Utami²

ABSTRACT

Background: High-risk pregnancy refers to pregnancies that can have significant adverse effects on both the mother and the baby, potentially leading to illness or even death before birth. One of the risk factors is an extended pregnancy interval. A long pregnancy gap can increase the risk of prolonged first-stage labor, premature rupture of membranes (PROM), and other complications. Additionally, as the pregnancy progresses, the body will adapt to the changes, making discomforts more likely during this period. Continuity of Care (COC) is an initial step in detecting issues and providing care according to the client's needs. Therefore, it is important for the author to provide continuous care to Mrs. Y, a multigravida with a 10-year pregnancy gap and discomfort, in order to detect problems early and provide care in accordance with midwifery service standards.

Objective: To provide continuous midwifery care (Continuity of Care - COC) during pregnancy, labor, postpartum, and for the newborn, according to midwifery management.

Results: The long pregnancy gap for Mrs. Y resulted in prolonged first-stage labor, leading to a cesarean section (C-section) to prevent harm and death for both the mother and the baby.

Conclusion: The continuous midwifery care provided adhered to the established midwifery service standards.

Keywords: Continuity of Care, Complementary Services, Multigravida, Midwifery

¹ Profession of Midwifery Student, Jenderal Achmad Yani University

² Profession of Midwifery Lecture, Jenderal Achmad Yani University