

**ASUHAN KEBIDANAN BERKESINAMBUNGAN PADA NY N
UMUR 25 TAHUN PRIMIPARA DI KLINIK PRATAMA SHAQI**

SEYEGAN KABUPATEN SLEMAN

Kinanti Sri Hayati Kurnia¹, Dwi Yulinda²

Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

INTISARI

Latar Belakang: Asuhan kebidanan yang diberikan sejak masa kehamilan, persalinan, nifas, neonatus, hingga penggunaan alat kontrasepsi merupakan asuhan kebidanan berkesinambungan. Selama penelitian berlangsung, ditemukan masalah dalam kehamilan seperti anemia dan janin letak lintang. **Tujuan Penelitian:** untuk melakukan asuhan kebidanan secara berkesinambungan terhadap Ny. N umur 25 tahun primipara sejak masa kehamilan, persalinan, nifas, dan bbl di Klinik Pratama Shaqi **Metode Penelitian:** Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengkaji peristiwa dan karakteristik yang terjadi selama periode penelitian melalui laporan kasus. Subjek penelitian ini adalah Ny. N, seorang primigravida berusia 25 tahun yang sedang hamil 29 minggu. Ny. N akan dipantau dan diberikan asuhan kehamilan hingga selesai nifas serta perawatan bayi baru lahir. **Hasil:** Masalah yang ditemukan dalam masa kehamilan berupa janin letak lintang dapat diatasi dengan *knee chest position* dan anemia dapat teratasi dengan pemberian tablet tambah darah 2x1 dan pemenuhan kebutuhan nutrisi yang tepat. Pada persalinan dilakukan *pelvic rocking* dengan *gymball* untuk membantu mempercepat kala 1 persalinan. Pijat oksitosin diberikan pada masa nifas untuk meningkatkan produksi ASI. Asuhan yang diberikan pada bayi baru lahir adalah asuhan esensial neonatus. **Kesimpulan:** Asuhan diberikan sejak bulan Januari-Mei meliputi asuhan kehamilan, persalinan, nifas, dan perawatan bayi baru lahir. Selama asuhan diberikan, terdapat beberapa masalah berupa janin letak lintang, anemia, serta ketidaknyamanan pada masa nifas seperti nyeri pada luka bekas episiotomi dan ketidaklancaran ASI. Masalah serta ketidaknyamanan yang terjadi dapat diatasi sehingga tidak menimbulkan komplikasi maupun kegawatdaruratan.

Kata Kunci: Asuhan Kebidanan Berkesinambungan, Letak Lintang, Anemia dalam Kehamilan

¹Mahasiswa Prodi Profesi Bidan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

²Dosen Prodi Profesi Bidan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

CONTINUITY MIDWIFERY CARE OF MRS. N 25 YEARS OLD PRIMIPARA AT CLINIC PRATAMA SHAQI SEYEGAN REGENCY SLEMAN

Kinanti Sri Hayati Kurnia¹, Dwi Yulinda²

Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

ABSTRACT

Background: Midwifery care provided from pregnancy, childbirth, postpartum, neonate, and the use of contraceptive equipment is the continuity midwifery of care. During the research, problems were found in pregnancy such as anemia and transverse baby position. **Aims:** To provide continuous midwifery care for Mrs. N 25 years old primiparous since pregnancy, childbirth, postpartum and neonates at Clinic Pratama Shaqi. **Method:** This research uses a qualitative descriptive approach to examine events and characteristics that occurred during the research period through case reports. The subjects of this research is Mrs. N, a 25 years old primigravida who is 29 weeks of pregnancy. Mrs. N will be monitored and given prenatal care until as well as care for the newborn. **Results:** Problems found during pregnancy in the form of transverse baby position can be overcome by knee chest position and anemia can be overcome by administering 2x blood supplement tablets and fulfilling proper nutritional needs. During labor, pelvic rocking is carried out with a gym ball to help speed up the first stage of labor. Oxytocin massage is given during the postpartum period to increase breast milk production. The care given to newborns is essential neonatal care. **Conclusion:** Care provided from January to May includes pregnancy, childbirth, postpartum and newborn care. During the time the care was provided, there were several problems such as misplaced fetus, anemia, and discomfort during the postpartum period such as pain in the episiotomy scar and poor breastfeeding. Problems and discomfort that occur can be resolved so that they do not cause complications or emergencies.

Keywords: Continuity Of Care, Transverse Baby Position, Anemia During Pregnancy

¹Student in the Midwife Professional Study Program of University Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

²Lecturer in the Midwife Professional Study Program of University Jenderal Achmad Yani Yogyakarta