

GAMBARAN KOMPLIKASI YANG TERJADI PADA BERAT BADAN  
LAHIR RENDAH DI RSUD WATES TAHUN 2015  
KABUPATEN KULON PROGO

*Isdian Ayu Safitri<sup>1</sup> Endah Puji Astuti<sup>2</sup>*

INTISARI

**Latar Belakang:** BBLR adalah bayi baru lahir yang berat saat lahir kurang dari 2500 gram memiliki risiko kematian yang lebih tinggi dari pada bayi yang lahir normal. Berdasarkan data Dinas Kabupaten Kulon Progo 2014, Bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR < 2500 gram) sebanyak 377 bayi dari 5.305 kelahiran hidup atau sebesar 7,1%. Komplikasi yang menjadi penyebab utama pada BBLR dan infeksi masih utama dan terbanyak, asfiksia. Capaian penanganan neonatal dengan asfiksia menjadi 59,68% pada tahun 2014.

**Tujuan:** Penelitian bertujuan untuk mengetahui gambaran komplikasi yang terjadi pada berat bayi lahir rendah (BBLR) di RSUD WATES tahun 2015.

**Metode:** Jenis penelitian ini menggunakan *deskriptif kuantitatif* dengan pendekatan *studi retrospektif*. pengambilan dengan teknik total sampling dengan responden 225 dalam penelitian ini menggunakan Analisis *Univariat* penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu pada bulan Januari-Desember di RSUD Wates tahun 2015

**Hasil:** Hasil penelitian didapatkan bahwa bayi BBLR di RSUD Wates Kabupaten Kulon progo tahun 2015 didapatkan bayi BBLR dengan komplikasi asfiksia sedang sebanyak 56 (24,9%) dan bayi BBLR dengan komplikasi asfiksia berat 4 (1,8%) bayi BBLR dengan komplikasi hipotermi 225 (100%), bayi BBLR dengan komplikasi Ikterus 62 (27,6%) dan bayi dengan komplikasi lain sebanyak 102 (45,3%).

**Kesimpulan:** Gambaran komplikasi pada berat badan lahir rendah yaitu rata-rata didapatkan bayi BBLR tidak mengalami komplikasi seperti asfiksia, hipotermi dan ikterus, rata-rata bayi BBLR mengalami komplikasi yang lain.

**Kata kunci:** komplikasi, Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR),

**DESCRIPTION OF COMPLICATIONS THAT OCCUR IN LOW  
BIRTH WEIGHT IN Hospital WATES 2015  
DISTRICT KULON PROGO**

***Isdian Safitri<sup>1</sup> Endah Ayu Puji Astuti<sup>2</sup>***

**ABSTRACT**

**Background:** LBW is a newborn baby birth weight less than 2500 grams have a higher death risk than infants born to normal. Based on the data of Kulon Progo Regency, 2014, Babies with low birth weight (LBW <2500 grams) of 377 infants out of 5305 live kelahirn or by 7.1%. Complications are a major cause of low birth weight and infection still on the main and most, asphyxia. Achievement handling the neonatal asphyxia becomes 59.68% in 2014.

**Objective:** The study aims to describe the complications that occur in low birth weight (LBW) in hospitals WATES 2015.

**Methods:** This study used quantitative descriptive retrospective study approach. taking the total sampling technique with respondents 225dalam this study using univariate analyst of this research using secondary data, in January-December 2015 in Wates District Hospital

**Results:** The results showed that low birth weight babies in hospitals Wates Kulon Progo 2015 obtained LBW infants with asphyxia complications were as many as 56 (24.9%) and LBW infants with severe asphyxia complications 4 (1.8%) LBW babies with complications of hypothermia 225 (100%), LBW babies with jaundice complications, 62 (27.6%) and other complications of infants with as many as 102 (45.3%).

**Conclusion:** Overview of complications of low birth weight which is the average obtained LBW infants had no complications such as asphyxia, hypothermia and jaundice, an average of LBW babies experiencing other complications.

**Keywords:** complications, Infant Low Birth Weight (LBW),

---

DIII Midwifery Diploma Students STIKES A Yani Yogyakarta  
Lecturer STIKES A. Yani Yogyakarta