

**GAMBARAN PEMBERIAN MAKANAN PENDAMPING ASI (MP-ASI)
PADA BALITA USIA 6-12 BULAN DI WILAYAH PUSKESMAS
GAMPING 1 SLEMAN YOGYAKARTA**

Rukiah Zainun¹, Dian Puspitasari²

INTISARI

Latar Belakang: Makanan pendamping ASI (MP-ASI) merupakan makanan yang diberikan pada anak usia 6-24 bulan. MP-ASI untuk bayi usia 6-8 bulan adalah makanan atau minuman yang mengandung gizi diberikan kepada bayi untuk memenuhi kebutuhan gizinya disaat usia 6-8 bulan. Hal ini dilakukan karena bayi membutuhkan lebih banyak gizi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian MP-ASI yaitu meliputi : faktor tingkat pengetahuan gizi ibu, faktor tingkat pendidikan, faktor pekerjaan ibu, faktor tingkat pendapatan, faktor penyakit infeksi.

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pemberian MP-ASI pada balita usia 6-12 bulan.

Metode: Penelitian observasional menggunakan rancangan *cross sectional*. Populasi 10 balita yang mengalami gizi kurang dengan teknik sampling jenuh. Alat pengumpulan data menggunakan lembar observasi.

Hasil: Pemberian MP-ASI tidak sesuai sebanyak 6 responden (60,0%). Karakteristik orang tua responden berdasarkan pendidikan sebagian besar berpendidikan SMP sebanyak 4 responden (40,0%), kemudian orang tua responden bekerja sebagian besar sebagai wiraswasta sebanyak 4 responden (40,0%) dan yang berpendapatan <UMR sebanyak 5 responden (50,0%)

Kesimpulan: Mayoritas ibu balita memberikan MP-ASI tidak sesuai sebanyak 6 responden (60,0%).

Kata kunci: MP-ASI, balita usia 6-12 bulan

¹ Mahasiswa Program Studi Kebidanan (D-3) Stikes Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

² Dosen Pembimbing Jurusan Kebidanan (D-3) Stikes Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

**THE DESCRIPTION OF COMPLIMENTARY FEEDING IN 6-12
MONTHS OLD INFANTS IN GAMPING HEALTH CENTER
COMMUNITY 1 SLEMAN YOGYAKARTA**

Rukiah Zainun¹, Dian Puspitasri²

ABSTRACT

Background: Complementary food is food fed for infants in the age of 6-24 months. Complementary feeding for infants in 6-8 months old are foods or drinks that contain nutrients to meet their nutritional needs. This is done because the baby needs more nutrients. Factors that affect the provision of complementary feeding are mothers nutrition knowledge level factors, education level factors, mother occupational factors, income levels factors, infectious disease factors.

Obyective: This study aims to describe the complementary feeding in 6-12 months old infants.

Method: This study is observational research *using cross sectional design*. The population is 10 children under five suffering malnutrition. To collect the data, it used saturated sampling technique. Data collection tool used the observation sheet.

Result: the result showed that the unsuitable breastfeeding is about 6 respondents (60.0%). Characteristics of respondents parents based on education that mostly have junior high school education is about 4 respondents (40.0%). the parents' accupation that mostly as entrepreneur is about 4 respondents (40.0%) and the under minimum income rate is about 5 respondents (50.0 %).

Conclusion: Majority of nursing mother gave complementary food is in not suitable category, as much as 6 respondents (60.0%).

Keywords: Complementary Food, 6-12 Months Old Infants

¹ Diploma Midwifery Students of STIKES Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

² Diploma Midwifery Thesis Supervisor of STIKES Jenderal Achmad Yani Yogyakarta