

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran faktor penyebab kejadian KPD pada ibu bersalin di RSUD Yogyakarta.

Berdasarkan hasil penelitian maka kesimpulan yang dapat diambil adalah :

1. Kejadian Ketuban Pecah Dini paling banyak terjadi pada ibu multipara yaitu sebanyak 245 orang (57,4%).
2. Kejadian Ketuban Pecah Dini paling banyak terjadi pada ibu dengan umur 20-35 tahun yaitu sebanyak 265 orang (62,1%).
3. Kejadian Ketuban Pecah Dini paling banyak terjadi pada umur kehamilan ≥ 37 minggu yaitu sebanyak 343 orang (80,3%).
4. Kejadian Ketuban Pecah Dini paling banyak terjadi pada kehamilan dengan pembesaran uterus normal sebanyak 410 orang (96,1%).
5. Kejadian Ketuban Pecah Dini paling banyak terjadi pada kehamilan dengan letak janin preskep sebanyak 396 orang (92,7%).

B. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian yang akan datang hendaknya dapat menyempurnakan hasil penelitian dengan melakukan analisa pada setiap faktor penyebab KPD dan dengan besar proporsi sampel yang sama pada setiap kategori.

2. Bagi pengguna perpustakaan

Mahasiswa hendaknya menggunakan hasil penelitian ini sebagai bacaan dipergustakaan guna menambah pengetahuan kebidanan tentang ketuban pecah dini.

3. Bagi tenaga kesehatan Bidan

Agar lebih dapat meningkatkan pelayanan ANC melalui deteksi dini kehamilan dan menekan terjadinya infeksi yang disebabkan oleh ketuban pecah dini.

4. Bagi Rumah Sakit

Lebih meningkatkan mutu dalam pelayanan kesehatan, dan dapat mengevaluasi setiap kasus yang ada di Rumah Sakit.

PERPUSTAKAAN
JENDERAL ACHMAD YANI
STIKES JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA