

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang berjudul “Gambaran Penyebab Kematian Neonatal di RSUD Panembahan Senopati Bantul Tahun 2015” dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyebab kematian neonatal paling banyak terjadi adalah pada kasus komplikasi yaitu sebanyak 58,7%.
2. Gambaran usia neonatal yang mengalami kematian paling banyak adalah neonatal usia dini yaitu sebanyak 41 neonatal (89,1%).
3. Persentase BBLR sebagai penyebab kematian neonatal adalah 13,0% dan kategori BBLR sebagai penyebab kematian terbanyak adalah BBLSR yaitu 83,3%.
4. Persentase asfiksia sebagai penyebab kematian neonatal (21,7%) dan kategori asfiksia sebagai penyebab kematian secara keseluruhan adalah asfiksia berat.
5. Persentase infeksi sebagai penyebab kematian neonatal sebanyak 3 kasus neonatal (6,5%).
6. Tidak ditemukan data kematian neonatal yang disebabkan karena kelainan kongenital.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan di atas maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Rumah Sakit Panembahan Senopati Bantul

Hasil penelitian ini diharapkan pihak rumah sakit lebih meningkatkan penanganan pada kegawatdaruratan neonatal terutama yang disebabkan karena komplikasi BBLR dan asfiksia.

2. Bagi Stikes Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipublikasikan kepada mahasiswa untuk memperdalam pengetahuan tentang penyebab kematian neonatal, sehingga mahasiswa mengetahui penyebab kematian neonatal.

3. Bagi Peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan peneliti yang akan meneliti obyek sejenis, lebih memperluas obyek penelitian ke penyebab dari komplikasi BBLR dan asfiksia karena sebagai penyebab terbanyak komplikasi.