

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan diatas maka kesimpulan yang dapat diambil adalah dari hasil penelitian yangtelah dilakukan yaitu bahwa faktor penyebab terjadinya kematian bayi di RSUD Panembahan Senopati Bantul adalah asfksia, BBLR, sepsis, kelainan kongenital, pneumonia dan penyakit komplikasi.
2. Distribusi frekuensi penyebab kematian yang disebabkan karena asfiksia sedang sebesar 4,5% dan asfiksia berat 22,7%.
3. Distribusi frekuensi penyebab kematian yang disebabkan karena BBLR sebesar sebesar 21,6%, BBLSR sebesar 10,2% dan BBLER sebesar 19,3%.
4. Distribusi fekuensi penyebab kematian yang disebabkan karena sepsis sebesar 6,8%.
5. Distribusi frekuensi penyebab kematian yang disebabkan karena kelainan kongenital sebesar 4,5%.
6. Distribusi frekuensi penyebab kematian yang disebabkan karena pneumonia sebesar 3,4%.
7. Distribusi frekuensi penyebab kematian karena penyakit komplikasi sebesar 43,2%.

8. Dari semua penyebab kematian bayi yang paling terbesar adalah penyakit komplikasi sebesar 43,2%.

B. Saran

Dapat dijadikan sebagai masukan dalam ilmu kesehatan terutama di bagian bayi, sehingga dapat memperluas dan memperkaya ilmu pengetahuan pembaca mengenai gambaran penyebab kematian bayi.

1. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat meneliti kembali tentang faktor penyebab lainnya kematian bayi, disamping itu peneliti diharapkan dapat melakukan penelitian dengan sampel yang lebih besar lagi dan di area yang lebih luas lagi, serta menggunakan metode penelitian yang lebih bervariasi untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik lagi.

2. Bagi Perpustakaan Stikes A. Yani

Diharapkan menambah bahan bacaan dalam bentuk karya tulis ilmiah dan sebagai tambahan referensi yang dapat digunakan sebagai bahan pedoman khususnya tentang kematian bayi.

3. Bagi Tenaga Kesehatan

Diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi awal dan sebagai acuan bagi seluruh tenaga kesehatan khususnya bidan.