

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tingkat pengetahuan tentang efek samping kontrasepsi IUD pascasalin dalam kategori cukup yaitu sebanyak 14 responden (46,7%).
2. Tingkat pengetahuan tentang efek samping kontrasepsi IUD pascasalin ekspulsi dalam kategori kurang yaitu sebanyak 13 responden (43,3%).
3. Tingkat pengetahuan tentang efek samping kontrasepsi IUD pascasalin perforasi dalam kategori kurang yaitu sebanyak 13 responden (43,3%).
4. Tingkat pengetahuan tentang efek samping kontrasepsi IUD pascasalin infeksi dalam kategori cukup yaitu sebanyak 14 responden (46,7%).
5. Tingkat pengetahuan tentang efek samping kontrasepsi IUD pascasalin perdarahan dalam kategori cukup yaitu sebanyak 13 responden (43,3%).
6. Tingkat pengetahuan tentang efek samping kontrasepsi IUD pascasalin mulas atau nyeri dalam kategori cukup yaitu sebanyak 16 responden (53,3%).

B. Saran

1. Bagi Ibu
 - 1) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan ibu wanita usia subur dalam hal ini mengenai tingkat pengetahuan akseptor IUD tentang efek samping IUD pascasalin

2. Bagi Petugas Kesehatan

Sebagai masukan kepada tenaga kesehatan agar selalu memberikan penyuluhan kepada ibu hamil dan ibu nifas agar mengetahui tentang kontrasepsi terutama IUD dan efek sampingnya.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan studi literatur dan acuan dalam melaksanakan penelitian lanjutan tentang KB IUD pascasalin.

PERPUSTAKAAN
JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA