

RELATIONSHIP BETWEEN THE DURATION USE OF CONTRACEPTIVES
PIL COMBINATION WITH WEIGHT GAIN ON
ACCEPTORS IN BPS YULI TRIYANI KB
Berbah SLEMAN YOGYAKARTA

Arie Febrianti¹, Tri Sunarsih², Ekawati³

ABSTRACT

Background: Family planning (FP) has been known almost all over Indonesia. In development countries, family planning is no longer a program or idea, but it is a philosophy of life. In developing countries, family planning is still a program whose implementation should be improved. Family planning program which was originally planned target achievement oriented, in line with the development program, has now turned into a quality-oriented aspect of great concern in the servants of family planning and reproductive health. Achievement participants Family Planning (FP) is active on all contraceptive methods rather than in October 2008 in Yogyakarta Special Region as much as 425,503 participants, in the city of Yogyakarta on 34,590 participants KB pesetas. The number of participants KB pills occupy the fourth with a number of 3,384 participants.

Objective: To determine the relationship between the duration of contraceptive pill use in combination with weight gain in family planning acceptors.

Research Methods: This study uses a correlation method with cross sectional approach was taken using a sample size of 42 Total Sampling Techniques. Then the results were analyzed with the statistical test Chi – Square.

Results: Calculation of Chi Square statistic shows calculated Chi Square value is smaller than the Chi Square table dk 1 ($5.665 < 3.841$). Test results obtained Fisher's exact test value 0.027 p-value < 0.05 then H_a is received.

Conclusion: There is a relationship between duration of use of contraceptive pills in combination with weight gain in family planning acceptors in connecticut Yuli Triyani Berbah Sleman Yogyakarta. With the results of this study indicate Fisher's exact test p value obtained value $0.027 < 0.05$ then H_a is received so that it can be stated there is a relationship between duration of use of contraceptive pills with weight gain acceptors KB pills.

Keywords: Duration of use of combined contraceptive pill, weight gain loss in family planning acceptors.

-
1. Student Diploma Midwifery STIKES A. Yani Yogyakarta
 2. Lecturer STIKES A. Yani Yogyakarta
 3. Lecturer STIKES A. Yani Yogyakarta

**HUBUNGAN ANTARA LAMANYA PEMAKAIAAN KONTRASEPSI
PIL KOMBINASI DENGAN KENAIKAN BERAT BADAN
PADA AKSEPTOR KB DI BPS YULI TRIYANI
BERBAH SLEMAN YOGYAKARTA**

Arie Febrianti¹, Tri Sunarsih², Ekawati³

INTISARI

Latar Belakang: Keluarga Berencana (KB) telah dikenal hampir di seluruh Indonesia. Di negara-negara maju, keluarga berencana bukan lagi merupakan suatu program atau gagasan, tetapi merupakan falsafah hidup masyarakat. Di negara-negara berkembang, keluarga berencana masih merupakan program yang pelaksanaannya harus ditingkatkan. Program Keluarga Berencana yang semula berencana berorientasi pada pencapaian target, Sejalan dengan perkembangan program, saat ini telah berubah menjadi berorientasi pada aspek kualitas yang menjadi perhatian besar dalam pelayan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi. Pencapaian peserta Keluarga Berencana (KB) aktif semua metode kontrasepsi pada bukan Oktober 2008 di Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 425.503 peserta, di kota Yogyakarta peserta KB aktif 34.590 peserta. Jumlah peserta KB pil menduduki perangkat keempat dengan jumlah 3.384 peserta.

Tujuan: Untuk mengetahui hubungan antara lamanya pemakaian kontrasepsi pil kombinasi dengan kenaikan berat badan pada akseptor KB.

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode korelasi dengan pendekatan *cross sectional*, sampel sebanyak 42 diambil menggunakan Teknik *Total Sampling*. Kemudian hasilnya dianalisa dengan uji *statistik Chi - Square*.

Hasil: Perhitungan statistik *Chi Kuadrat* menunjukkan nilai *Chi Kuadrat* hitung lebih kecil dari *Chi Kuadrat* tabel pada dk 1 ($5,665 < 3,841$). Hasil pengujian *fisher's exact test* didapatkan nilai p value $0,027 < 0,05$ maka H_a diterima.

Kesimpulan: Ada hubungan antara lamanya pemakaian kontrasepsi pil kombinasi dengan kenaikan berat badan pada akseptor KB di BPS Yuli Triyani Berbah Sleman Yogyakarta. Dengan hasil penelitian ini menunjukkan *fisher's exact test* didapatkan nilai p value $0,027 < 0,05$ maka H_a diterima sehingga dapat dinyatakan ada hubungan antara lama pemakaian kontrasepsi pil dengan kenaikan berat badan askseptor KB pil.

Kata Kunci: Lamanya pemakaian kontrasepsi pil kombinasi, Kenaikan berat badan pada akseptor KB.

¹ Mahasiswa Diploma III Kebidanan STIKES A. Yani Yogyakarta

² Dosen STIKES A. Yani Yogyakarta

³ Dosen STIKES A. Yani Yogyakarta