

**HUBUNGAN PEMBERIAN MAKANAN PENDAMPING ASI  
DENGAN KEJADIAN DIARE PADA BAYI USIA  
0 – 6 BULAN DI PUSKESMAS KASIHAN 1  
BANTUL YOGYAKARTA  
TAHUN 2011**

Kuningsih<sup>1</sup> , Tri Sunarsih, S. ST, M.Kes<sup>2</sup>, Ekawati, S. Si.T<sup>3</sup>

**INTISARI**

**Latar Belakang:** Pemberian (MPASI) diberikan setelah bayi usia 6 bulan. Bayi usia 0 – 6 bulan harus diberi Air Susu Ibu (ASI), apabila pada usia tersebut sudah diberi Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP ASI) akan terjadi diare. Penyakit diare masih menjadi penyebab kematian balita (bayi dibawah lima tahun) terbesar di dunia. Menurut catatan UNICEF, setiap detik satu balita meninggal karena diare. Diare membunuh dua juta anak di dunia setiap tahun. Hal ini bertujuan untuk ibu menyusui khususnya, tentang pentingnya ASI eksklusif bagi bayinya serta pentingnya menjaga kesehatan bayi terutama terhadap penyakit diare.

**Tujuan Penelitian:** Untuk mengetahui hubungan pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI) dengan kejadian diare pada bayi usia 0 – 6 bulan di Puskesmas Kasihan 1 Bantul tahun 2011.

**Metode Penelitian:** Penelitian ini menggunakan rancangan korelasi, dengan menggunakan pendekatan waktu *cross sectional*. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu – ibu yang mempunyai bayi usia 0 – 6 bulan yang berkunjung di Puskesmas Kasihan 1 Bantul. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *Accidental Sampling* dengan jumlah sample yang diambil adalah 40 orang. Analisis data menggunakan analisis *Chi Square*.

**Hasil penelitian:** Sebagian besar responden memberikan makanan pendamping ASI yaitu 34 responden (85%). Sedangkan kejadian diare sebagian besar bayi usia 0-6 bulan mengalami diare kategori diare dehidrasi ringan 25 bayi (62,5%).

**Kesimpulan:** Pemberian makanan pendamping ASI mempunyai hubungan yang signifikan dengan kejadian diare pada bayi usia 0-6 bulan di puskesmas Kasihan 1 Bantul tahun 2011.

**Kata Kunci:** Makanan pendamping ASI, kejadian diare

Kepustakaan: 25

Hal: i-xvi, 1-66

<sup>1)</sup> Mahasiswa STIKES A. Yani DIII Kebidanan

<sup>2)</sup> Dosen Pembimbing I STIKES A. Yani Yogyakarta

<sup>3)</sup> Dosen Pembimbing II STIKES A. Yani Yogyakarta

**THE RELATIONSHIP BETWEEN GIVING SUPPLEMENT FOOD  
BESIDE BREASTFEEDING AND DIARRHEA CASE AT 0-6  
MONTHS AGED BABY IN PUSKESMAS KASIHAN 1  
BANTUL YOGYAKARTA  
IN 2011**

Kuningsih<sup>1</sup> , Tri Sunarsih<sup>2</sup>, S. ST,.M.Kes, Ekawati, S. Si.T<sup>3</sup>

**ABSTRACT**

**Background:** MPASI is given to the baby at the age of minimum 6 months. The baby at age of 0-6 months must get Breastfeeding (ASI), if the babies at those ages have been given supplement food beside ASI (MPASI), they will get diarrhea. Diarrhea becomes the main cause of baby mortality (for the babies under five years old). According to UNICEF data, in one second, one baby dies caused by diarrhea. Diarrhea kills two millions children in the world per year. It aims especially for breastfeeding mother about the importance of exclusive breastfeeding for the baby and the importance for guarding the baby's health especially towards diarrhea and it is expected that the mother can give exclusive breastfeeding for the baby.

**Objective of research:** To know the relationship between giving supplement food beside breastfeeding (MPASI) and diarrhea case at 0-6 months aged baby in Puskesmas Kasihan 1 Bantul in 2011.

**The Research Method:** This research uses correlation design, by using cross sectional time approach. The research population is mothers who have baby at the age of 0-6 months visiting Puskesmas Kasihan 1 Bantul. The sample is obtained by using sample *accidental sampling* method with sample number is 40 people. The data analysis uses *Chi Square*.

**The Result of Research:** Most respondents give supplement food beside breastfeeding as 34 respondents (85%). Whereas the diarrhea case is happened to the baby at the age of 0-6 months who get minor dehydration diarrhea as 25 babies (62,5%).

**Conclusion:** The supplement food beside breastfeeding has significant relationship towards diarrhea case at the 0-6 months aged baby in Puskesmas Kasihan 1 Bantul in 2011.

**Keywords:** Supplement food beside breastfeeding, diarrhea case

**Literature:** 25

**Page:** i-xvi, 1-66

<sup>1</sup> Mahasiswa STIKES A. Yani DIII Kebidanan

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing I STIKES A. Yani Yogyakarta

<sup>3</sup> Dosen Pembimbing II STIKES A. Yani Yogyakarta