

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sebagian besar responden memberikan makanan pendamping ASI yaitu 34 responden (85%).
2. Sebagian besar bayi usia 0-6 bulan mengalami diare kategori diare dehidrasi ringan 25 bayi (62,5%).
3. Ada hubungan pemberian makanan pendamping ASI dengan kejadian diare pada bayi usia 0-6 bulan di puskesmas Kasihan 1 Kasihan Bantul tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa bayi yang diberi MP ASI cenderung mengalami diare. Hal yang ditunjukkan dengan nilai χ^2 hitung sebesar sebesar $40 > \chi^2$ tabel sebesar 9,488 maka H_a diterima.

B. Saran

1. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam praktek pelayanan kesehatan terhadap masyarakat khususnya ibu dan bayi.

2. Bagi Instansi Stikes A. Yani

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi pembaca sehingga dapat bermanfaat bagi instansi Stikes Ahmad Yani Yogyakarta.

3. Bagi Tenaga Kesehatan di Puskesmas Kasihan 1 Bantul

Memberi masukan bagi tenaga kesehatan seperti dokter, bidan, perawat di Puskesmas dalam evaluasi terhadap pelayanan kesehatan ibu dan anak khususnya dalam pemberian makanan pendamping ASI dengan kejadian diare pada bayi usia 0 – 6 bulan.

4. Bagi Masyarakat Khususnya Ibu - Ibu yang Mempunyai Bayi Usia 0 -6 Bulan

Sebagai informasi tambahan bagi ibu menyusui khususnya, tentang pentingnya ASI eksklusif bagi bayi serta pentingnya menjaga kesehatan bayi terutama terhadap penyakit diare dan diharapkan ibu-ibu mau melaksanakan pemberian ASI eksklusif kepada bayinya dalam upaya mencegah penyakit diare.