

ABSTRACT

RELATIONSHIP OF KNOWLEDGE MOTHER ABOUT FOOD COACH ASI WITH EVENT DIARRHEA ON BABY IN PUSKESMAS GAMPING II SLEMAN YOGYAKARTA YEAR 2011

Sulfi Ardiani¹, Atik Badi'ah², Dechoni Rahmawati³

Background: Until now the disease is also often referred to diarrhea or gastroenteritis, is still a problem of society in Indonesia. Chronological list of causes of visits Puskesmas/clinic, almost always included in group 3 main causes to the center Puskesmas. Figures of pain is around 200-400 incidence of diarrhea among the 1000 population every year. Patients with diarrhea about 60 million incidents every year in Indonesia, the majority (70-80%) of these patients are children under 5 years (40 million events. Therefore it is very important for mothers to have knowledge of the MP- ASI for the baby to minimize the incidence of diarrhea.

Objective: To determine the relationship level of knowledge of mothers about food supplementary ASI with the incidence of diarrhea in baby in the Puskesmas Gamping II, Sleman, Yogyakarta. This type of study is an analytic observational to approach time *cross-sectional*. Technique sampling using *accidental sampling* as many as 45 people. Analysis of data using test correlation non parametric *Kendall's tau*.

Results: 1) There is relationship a significant between level of knowledge mothers about food supplementary ASI with the incidence of diarrhea in baby in the Puskesmas Gamping II, Sleman, Yogyakarta, evidenced $\chi^2_{hitung} > \chi^2_{tabel} > (6.827 > 5.991)$ and value $p < 0.05$ ($p = 0.033 < 0, 05$), 2) The level of knowledge mothers about food supplementary ASI in the baby category of knowledge good (48.9%), 3) Incidence of diarrhea in baby in the Puskesmas Gamping II, Sleman, Yogyakarta categories of diarrhea (64.4%).

Conclusion: There is relationship a significant between level of knowledge mothers about food supplementary ASI with the incidence of diarrhea in baby in the Puskesmas Gamping II, Sleman, Yogyakarta, evidenced $\chi^2_{hitung} > \chi^2_{tabel} > (6.827 > 5.991)$ and value $p < 0.05$ ($p = 0.033 < 0, 05$).

Keyword : Knowledge Mother, Food Coach ASI, Diarrhea on Baby

Bibliography : 16 book

Page Yard : xiv, 60 page yard

-
1. Students STIKES A. Yani Yogyakarta
 2. Lecturer Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
 3. Lecturer STIKES A. Yani Yogyakarta

INITISARI

HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN IBU TENTANG MAKANAN PENDAMPING ASI DENGAN KEJADIAN DIARE PADA BAYI DI PUSKESMAS GAMPING II SLEMAN YOGYAKARTA TAHUN 2011

Sulfi Ardiani¹, Atik Badi'ah², Dechoni Rahmawati³

Latarbelakang: Sampai saat ini penyakit diare atau juga sering disebut gastroenteritis, masih merupakan masalah masyarakat di Indonesia. Daftar urutan penyebab kunjungan puskesmas / Balai pengobatan, hampir selalu termasuk dalam kelompok 3 penyebab utama ke puskesmas. Angka kesakitannya adalah sekitar 200-400 kejadian diare di antara 1000 penduduk setiap tahunnya. Penderita diare sekitar 60 juta kejadian setiap tahunnya di Indonesia, sebagian besar (70-80%) dari penderita ini adalah anak di bawah umur 5 tahun (40 juta kejadian). Oleh karena itu sangat penting bagi ibu memiliki pengetahuan tentang MP-ASI bagi bayi untuk meminimalisir angka kejadian diare.

Tujuan: untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan ibu tentang makanan pendamping ASI dengan kejadian diare pada bayi di puskesmas Gamping II, Sleman, Yogyakarta. Jenis penelitian yang digunakan adalah analitik observasional dengan pendekatan waktu *cross sectional*. Teknik sampling menggunakan *accidental sampling* yaitu sebanyak 45 orang. Analisa data menggunakan uji korelasi non parametrik *Kendall's tau*.

Hasil: 1) Terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan ibu tentang makanan pendamping ASI dengan kejadian diare pada bayi di puskesmas Gamping II, Sleman, Yogyakarta, dibuktikan $\chi^2_{hitung} > \chi^2_{tabel}$ (6,827 > 5,991) dan nilai $p < 0,05$ ($p = 0,033 < 0,05$), 2) Tingkat pengetahuan ibu tentang Makanan Pendamping ASI pada bayi kategori pengetahuan baik (48,9%), 3) Kejadian diare pada bayi di puskesmas Gamping II, Sleman, Yogyakarta kategori diare (64,4%)

Simpulan: Terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan ibu tentang makanan pendamping ASI dengan kejadian diare pada bayi di puskesmas Gamping II, Sleman, Yogyakarta, dibuktikan $\chi^2_{hitung} > \chi^2_{tabel}$ (6,827 > 5,991) dan nilai $p < 0,05$ ($p = 0,033 < 0,05$), 2).

Kata kunci : Pengetahuan Ibu, MP-ASI, Diare pada Bayi

Kepustakaan : 16 buku

Halaman : xiv, 60 halaman

¹ Mahasiswa Diploma III Kebidanan STIKES A. Yani Yogyakarta

² Dosen Poltekkes kemenkes Yogyakarta

³ Dosen STIKES A. Yani Yogyakarta