

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil beberapa kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian sebagai berikut.

1. Tingkat pengetahuan ibu tentang Makanan Pendamping ASI pada bayi kategori pengetahuan baik (48,9%)
2. Kejadian diare pada bayi di puskesmas Gamping II, Sleman, Yogyakarta kategori pernah mengalami diare (73,3%)
3. Terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan ibu tentang makanan pendamping ASI dengan kejadian diare pada bayi di puskesmas Gamping II, Sleman, Yogyakarta, dibuktikan $Z_{hitung} > Z_{tabel}$ ($5,42 > 1,980$) dan dengan $p\text{ value} = 0,000$ ($p < 0,05$).

B. Saran

1. Bagi Bidan di wilayah Puskesmas Gamping II Sleman

Bidan di Puskesmas Gamping II disarankan dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penyuluhan khususnya kesehatan ibu dan anak dengan cara melakukan pemberian pengetahuan khususnya tentang makanan pendamping ASI (MP-ASI) dengan kejadian diare pada bayi baik secara formal maupun melalui kegiatan kemasyarakatan.

2. Bagi ibu-ibu yang memiliki bayi di Puskesmas Gamping II Sleman

Ibu disarankan dapat memperhatikan pemberian MP-ASI pada bayinya dengan cara bertanya atau mencari pengetahuan tentang cara memberikan MP-ASI yang baik bagi anaknya sehingga dapat mengurangi potensi bayi terkena diare.

3. Bagi Peneliti Lain

Peneliti lain dapat meneruskan penelitian sejenis dengan mencari dimensi lain yang dapat mempengaruhi kejadian diare pada bayi.

PERPUSTAKAAN
JENDERAL ACHMAD YANI
STIKES JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA