

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan mengenai hubungan antara tingkat pengetahuan imunisasi DPT Combo dengan tingkat kecemasan pasca imunisasi DPT Combo dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Tingkat pengetahuan responden tentang imunisasi DPT Combo adalah tinggi yaitu sebanyak 15 orang (46,9%).
2. Tingkat kecemasan responden pasca imunisasi DPT Combo adalah ringan yaitu sebanyak 20 orang (62,5%).
3. Ada hubungan signifikan antara tingkat pengetahuan tentang imunisasi DPT Combo dengan tingkat kecemasan pasca imunisasi DPT Combo yaitu nilai *Sig (2-tailed)* sebesar 0,000 yang lebih kecil dari $\alpha = 5\%$, koefisien korelasi -0,781.

B. SARAN

Sesuai dengan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Stikes Achmad Yani Yogyakarta

Para dosen dan mahasiswa STIKES A. Yani, khususnya mahasiswa program studi kebidanan diharapkan membaca hasil penelitian ini, karena hasil penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan serta menambah wawasan serta referensi mengenai hubungan tingkat

pengetahuan tentang imunisasi DPT Combo dengan tingkat kecemasan ibu pasca imunisasi DPT Combo.

2. Bidan di Posyandu Desa Madukara

Bidan di Posyandu Desa Madukara diharapkan membaca hasil penelitian ini, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan pelayanan dan penyuluhan kepada ibu tentang imunisasi khususnya imunisasi DPT Combo agar kecemasan ibu bisa berkurang.

3. Peneliti Selanjutnya

Peneliti diharapkan lebih memperluas variabel yang berhubungan dengan tingkat kecemasan pasca imunisasi DPT Combo seperti variabel keadaan fisik dan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar cakupan mengenai variabel yang berhubungan dengan tingkat kecemasan pasca imunisasi DPT Combo dapat lebih luas dan penelitian-penelitian selanjutnya dapat memberikan temuan baru dan dapat memberikan sumbangan baru untuk ilmu pengetahuan di bidang kesehatan.