

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu :

1. Tingkat pengetahuan ibu tentang imunisasi BCG di BPS Sularsi, Kepek, Gunung Kidul sebagian besar adalah tinggi sebanyak 15 orang (48,4%).
2. Tingkat kecemasan ibu pasca pemberian imunisasi BCG pada bayinya di BPS Sularsi, Kepek, Gunung Kidul sebagian besar adalah ringan, yaitu sebanyak 15 orang (48,4%).
3. Terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan ibu tentang imunisasi BCG dengan tingkat kecemasan ibu pasca pemberian imunisasi BCG pada bayinya di BPS Sularsi, Kepek, Gunung Kidul ditunjukkan dari hasil uji korelasi *kendals tau* diperoleh $p\text{-value}$ sebesar $0,000 < \alpha (0,05)$
4. Terdapat keeratan hubungan yang kuat antara tingkat pengetahuan dengan tingkat kecemasan ibu pasca pemberian imunisasi BCG pada bayinya di BPS Sularsi, Kepek, Gunung Kidul ditunjukkan dari nilai koefisien (τ) sebesar 0,660.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi STIKES A. Yani Yogyakarta (*scientific*)

Penelitian ini hendaknya digunakan sebagai bahan bacaan atau *literature* tambahan untuk menambah wawasan ilmu kebidanan terutama bidang asuhan neonatus, bayi dan balita mengenai imunisasi BCG.

2. Bagi Bidan Praktek Swasta Sularsi, Kepek, Gunung Kidul

Bidan praktek swasta hendaknya memberikan asuhan kebidanan kepada ibu tentang imunisasi BCG agar ibu memiliki pemahaman yang benar tentang imunisasi sehingga kecemasan ibu pasca pemberian imunisasi BCG juga akan menurun.

3. Bagi Peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya hendaknya memperluas penelitian ini dengan menambahkan faktor-faktor lain yang berhubungan dengan tingkat kecemasan ibu pasca pemberian imunisasi BCG, seperti: keadaan fisik atau penyakit dan sosial budaya.