

HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN IBU NIFAS TENTANG PERAWATAN TALI PUSAT DENGAN KEJADIAN INFEKSI DI BPS ENDANG PURWANINGSIH PLERET BANTUL YOGYAKARTA

Zuly Dwi Dayati¹, Atik Badi'ah², Nur Rahmawati Sholihah³

INTISARI

Latar Belakang: Menurut WHO Angka Kematian Bayi (AKB) yang disebabkan oleh infeksi tali pusat sebesar 560.000, negara Afrika 126.000 (21%), negara asia tenggara 220.000. Timbulnya infeksi disebabkan kurangnya pengetahuan ibu tentang perawatan bayi sehari-hari yang benar.

Tujuan Penelitian: Mengetahui hubungan tingkat pengetahuan ibu nifas tentang perawatan tali pusat dengan kejadian infeksi tali pusat di BPS Endang Purwaningsih Pleret Bantul Yogyakarta tahun 2012

Metode Penelitian: Jenis penelitian adalah *survey analitik* dengan pendekatan waktu *cross sectional*. Populasi penelitian ini adalah ibu nifas yang bersalin di BPS Endang Purwaningsih Pleret Bantul Yogyakarta berjumlah 30 orang. Teknik sampling menggunakan total sampling. Uji statistik menggunakan *Chi-square*.

Hasil Penelitian: Tingkat pengetahuan ibu nifas tentang perawatan tali pusat termasuk tinggi yaitu 14 orang (46,7%). Sebagian besar bayi baru lahir tidak mengalami kejadian infeksi yaitu 27 orang (90%). Hasil uji *Chi Square* memperlihatkan nilai χ^2 sebesar 21.667 dengan taraf signifikansi (p) 0,000.

Kesimpulan: Ada hubungan tingkat pengetahuan ibu nifas tentang perawatan tali pusat dengan kejadian infeksi tali pusat di BPS Endang Purwaningsih Pleret Bantul Yogyakarta.

Kata kunci : Tingkat Pengetahuan, Perawatan Tali Pusat, Kejadian Infeksi
Kepustakaan : 21 buku (2001-2011), 4 *website*
Jumlah halaman : i-xi, isi 1-66

¹ Mahasiswa D III Kebidanan STIKES A. Yani Yogyakarta

² Dosen Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, Jurusan Keperawatan

³ Dosen STIKES Achmad Yani Yogyakarta

RELATIONSHIP OF KNOWLEDGE ABOUT MOTHER POSTNATAL WITH CARE UMBILICAL CORD INFECTION EVENT IN BPS ENDANG PURWANINGSIH PLERET BANTUL YOGYAKARTA

Zuly Dwi Dayati¹, Atik Badi'ah², Nur Rahmawati Sholihah³

ABSTRACT

Background : According to the WHO Infant Mortality Rate (IMR) caused by infection of the umbilical cord 560 000, 126 000 African (21%), Southeast Asian 220,000. Incidence of infection due to the lack of knowledge of mothers about infant care everyday right.

Research's Purpose: To determine the relationship of knowledge about mother postnatal with care umbilical cord infection event in BPS Endang Purwaningsih Pleret Bantul Yogyakarta.

Research's Method : This type of research is an analytic survey with a cross-sectional approach. The study population was postpartum who give birth at BPS Endang Purwaningsih Pleret Bantul Yogyakarta were 30. Sampling technique using total sampling. Statistical tests using Chi-square

Research's Result : The level of knowledge about the treatment of postpartum umbilical cord is high, that is 14 people (46.7%). Most newborns do not experience the incidence of infection at 27 people (90%). Chi Square test results showed χ^2 value of 21 667 with a significance level (p) 0.000.

Conclusion : There is a relationship level of knowledge about the treatment of postpartum mothers with the incidence of infection of the umbilical cord at the BPS Endang Purwaningsih Pleret Bantul Yogyakarta.

Keywords : The knowledge level, Umbilical Cord Care, incident Infection
Bibliography : 21 books (2001-2011), 4 website
Number of yards : i-xi, content 1-66

¹Student DIII Midwifery of STIKES Achmad Yani Yogyakarta

²Lecture of Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, Majors Nursing

³Lecture of STIKES Achmad Yani Yogyakarta