

RELATIONS KNOWLEDGE LEVEL PREGNANT WOMEN IN
CONSUMPTION FE COMPLIANCE WITH THE CONSUMPTION OF FE IN
CONNECTICUT MURYATI, KALASAN, SLEMAN, YOGYAKARTA,
IN 2011.

Sangkut India¹, Fahrudin M, Kes², Endang S. Suprati SST³

ABSTRAC

Background: Maternal mortality rates (MMR) in Indonesia knowledge 2007 recorded 248 per 100,000 live births. (Suparti, 2009). MMR in Yogyakarta in 2009 reached 104 per 100,000 live births in 2010 hidup.sementara target AKI according to the Ministry of Health of the Republic of Indonesia (RI Health Department) is 150 per 100,000 live births (Achmad Sujudi, 2003). AKI is often caused by bleeding, bleeding causing anemia and anemia are common in pregnant women is iron deficiency anemis and according to the ANC (ante natal care) performed at BPS Muryati, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Gained 9.4% (5 persons), of 53 pregnant women consume Fe disobedient, while 28.3% (15 people) from 53 pregnant women consume is the level of compliance, and 62.3% (33 pregnant women) compliance rate of consumption Fe nya obedient in consuming Fe. And 9 men (17.0%) high-level knowledge, 26 people (49.1%) level of knowledge is, 18 people (34.0%) Knowledge relations low.

Results purpose: To determine the relationship level of knowledge in the consumption of pregnant women with compliance Fe Fe consumption in Connecticut Muryati, Kalasan, Sleman, Yogyakarta Research Methods: Type a descriptive analytic study, cross-sectional approach. The research was conducted at BPS Muryati, Kalasan, Sleman June - July 2011 This research sampel Adala 53 respondents to the accidental sampling technique, primary data obtained directly from the respondent data analysis using the Kendall Tau.

The results: Based on the analysis of Kendal Tau obtained with the formula z z values calculated and the value of $z = 4.683$ Table 0.5: $2 = 0.025 = 0, 443 = 4430$ next be seen in the table to find z z table and the result is 1.960 count so $z > z$ tables and 0.010% error rate $< 0.05\%$ can be concluded that the value is significant.

Conclusion: There is a level of knowledge in the consumption of pregnant women with compliance Fe Fe consumption in Connecticut Muryati Kalasan, Sleman in 2011.

Keywords: Knowledge, Compliance

-
1. Student of Diploma of Midwifery study Programme Achmad Yani Yogyakarta school of Health Sciences
 2. Lecturer STIKES Achmad yani Yogyakarta, school of Health Sciences

3. Lecturer STIKES Achmad yani Yogyakarta, school of Health Sciences
 HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN IBU HAMIL DALAM KONSUMSI
 FE DENGAN KEPATUHAN KONSUMSI FE DI BPS MURYATI
 KALASAN SLEMAN Y vii AKARTA TAHUN 2011

Sangkut India¹, Fahrudin M. Kes², Endang Suprati S.SST³

INTISARI

Latar Belakang: Angka kematian ibu (AKI) di indonesia tahun 2007 tercatat 248 per 100.000 kelahiran hidup.(Suparti,2009). AKI di Jogjakarta pada tahun 2009 mencapai 104 per 100.000 kelahiran hidup.sementara pada tahun 2010 target AKI menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia (DEPKES RI) adalah 150 per 100.000 kelahiran hidup (Achmad Sujudi,2003). AKI sering disebabkan oleh perdarahan, perdarahan menyebabkan terjadi anemia dan anemia yang sering terjadi pada ibu hamil adalah anemis defisiensi besi dan menurut ANC (Ante natal care) yang dilakukan di BPS Muryati, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Didapat 9,4% (5 orang), dari 53 ibu hamil tidak patuh mengkonsumsi Fe, sementara 28,3% (15 orang) dari 53 ibu hamil tingkat kepatuhan konsumsi sedang, dan 62,3% (33 ibu hamil) tingkat kepatuhan konsumsi Fe patuh dalam mengkonsumsi Fe. Dan 9 orang (17,0%) tingkat pengetahuan tinggi, 26 orang (49,1%) tingkat pengetahuannya sedang, 18 orang (34,0%) tingkat pengetahuannya rendah.

Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan ibu hamil dalam konsumsi Fe dengan kepatuhan konsumsi Fe di BPS Muryati, Kalasan, Sleman, Yogyakarta Metode Penelitian: Jenis penelitian *deskriptif analitik*, pendekatan *cross sectional*. Penelitian ini dilakukan di BPS Muryati,Kalasan,Sleman bulan juni – juli 2011 sampel penelitian ini adala 53 responden dengan teknik *accidental sampling*, data primer diperoleh langsung dari responden analisis data menggunakan *Kendall Tau*.

Hasil penelitian: Berdasarkan analisis Kendal Tau dengan rumus z didapat nilai z hitung = 4,683 dan nilai z table 0,5: 2 = 0,025 = 0, 443 =4430 selanjutnya dilihat pada table z untuk mengetahui z table dan hasilnya 1,960 jadi z hitung > z table dan tingkat kesalahannya 0,010% < 0,05% dapat disimpulkan bahwa nilai tersebut signifikan.

Kesimpulan: Ada hubungan tingkat pengetahuan ibu hamil dalam konsumsi Fe dengan kepatuhan konsumsi Fe di BPS Muryati Kalasan, Sleman tahun 2011.

Kata Kunci: Pengetahuan, Kepatuhan

¹ Mahasiswa D3 Kebidanan Stikes A yani Yogyakarta

² Dosen Pembimbing 1 Karya Tulis Ilmiah

³ Dosen Pembimbing 2 Karya Tulis Ilmiah