

INTISARI
PERBEDAAN KECEMASAN IBU HAMIL TRIMESTER
III PRIMIGRAVIDA DAN MULTIGRAVIDA
DALAM MENGHADAPI PERSALINAN
DI RB BINA SEHAT BANTUL

Chusnaini¹, Esti Nugraheny², Imroatul Aziza³

Latar belakang: Negara miskin, sekitar 25-50% kematian wanita subur di sebabkan dari kehamilan dan diperkirakan sekitar 127.000 wanita penyebab kematian ibu adalah persalinan macet, Kecemasan atau kekhawatiran yang timbul karena dirasakan terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan berasal dari dalam (intra psikis), dan dapat mengakibatkan persalinan menjadi lama/partus lama atau perpanjangan Kala II.

Tujuan: Mengetahui perbedaan kecemasan ibu hamil trimester III primigravida dan multigravida dalam menghadapi persalinan.

Metode penelitian: Menggunakan *Comparative Study*. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 100 ibu hamil, dengan teknik pengambilan sampel adalah *perposive sampling* dengan sampel sejumlah 50 responden dan uji analisis *t-test* independen dengan $\alpha = 5\%$

Hasil: Perbedaan kecemasan primigravida dan multigravida dengan *t* hitung sebesar 8.972, berarti lebih besar dari *t* tabel 1.67722, dan signifikan sebesar 0.000. Jika *t* hitung $>$ *t* tabel maka *H₀* ditolak, dan *H_a* diterima.

Simpulan: Ada kecemasan ibu hamil trimester III primigravida dan multigravida dalam menghadapi persalinan.

Katakunci: Kecemasan menghadapi proses persalinan, primigravida dan multigravida

¹ Mahasiswa Diploma III Kebidanan Stikes A. Yani Yogyakarta

² Dosen tetap Stikes A. Yani Yogyakarta

³ Dosen Stikes A. Yani Yogyakarta

ABSTRACT

DIFFERENCES IN ANXIETY PRIMIGRAVIDA III TRIMESTER PREGNANT WOMEN AND IN DEALING MULTIGRAVIDA GIVE BIRTH IN RB BINA SEHAT BANTUL

Chusnaini¹, Esti Nugraheny², Imroatul Aziza³

Background: Poor countries, approximately 25-50% of infertile women in the cause of death from pregnancy and an estimated 127,000 women causes of maternal deaths are stalled labor, anxiety or concerns that arise because of perceived something unpleasant happens comes from within (intra-psychic), and can lead to a long labor / parturition prolonged or extended Kala II.

Objective: This study aims to know the difference anxiety pregnant III trimester primigravidae and multigravida pesalinan preformance face.

Method: This research method is a method of comparison (Comparative Study), and using cross-sectional study approach. The population in this study were 100 pregnant women, sempel retrieval techniques are sampling purposive

Results: The differences in anxiety and multigravida primigravidae produce t count for 8972, meaning greater than 1.67722 t table, with a value significantly by 0000. If the t count > t table then Ho is rejected and Ha accepted.

Conclusion: The results could be in simpulkn that there are differences in maternal anxiety and TM III primigravida multigravida in menghagapi pesalinan obtained from t values obtained in the test analysis of the value t count > t table with a significant and Ha 0000 and accepted that there are differences in maternal anxiety pregnant primigravidae and multigravida.

Keywords: Anxiety facing the birth process, primigravidae and multigravida

1. Midwifery Diploma students Stikes A. Yani Yogyakarta
2. Lecturers Stikes A. Yani Yogyakarta
3. Lecturer Stikes A. Yani Yogyakarta