

**HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU Hamil TRIMESTER III TENTANG EFEK
SAMPING JAMU DENGAN PERILAKU MENGKONSUMSI JAMU
DI DESA KERINJING KECAMATAN DUKUN
KABUPATEN MAGELANG
JAWA TENGAH**

INTISARI

Suyatmi¹, Endah Puji Astuti², Ari Sulistyawati³

Latar Belakang : Jamu adalah ramuan turun-temurun dari nenek moyang. Jamu yang dikonsumsi ibu hamil trimester III adalah jamu cabe peuyang. Kandungan jamu cabe peuyang adalah cabe jamu, lempuyang, adas, pulosari, kunir, kedawung, keningar, asam kawak. Efek samping mengkonsumsi jamu pada ibu hamil trimester III adalah menghambat proses persalinan, ketuban keruh, *hyper trophic pyloric stenosis*, bayi *asfiksi*. Kehamilan pada trimester III adalah umur kehamilan 7 bulan hingga kehamilan 9 bulan. Berdasarkan studi pendahuluan di Desa Kerinjing dari 10 ibu hamil trimester III terdapat 5 ibu hamil yang mengkonsumsi jamu.

Tujuan : Untuk mengetahui hubungan pengetahuan ibu hamil trimester III tentang efek samping jamu dengan perilaku mengkonsumsi jamu di Desa Kerinjing Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang Jawa Tengah.

Metode Penelitian : Jenis penelitian yang digunakan adalah *survey analitik* yaitu melihat tanpa perilaku sengaja untuk menimbulkan / membangkitkan suatu gejala keadaan. Penelitian ini menggunakan *cross sectional* model pendekatan yang menggunakan satu kali mengumpulkan data dilakukan dengan cepat. Teknik sampling dengan total sampling adalah penentuan sampel dengan mengambil keseluruhan populasi.

Hasil : Hasil penelitian adalah hubungan pengetahuan ibu hamil trimester III tentang efek samping masih kurang ada 38,2 % dan hasil dari perilaku mengkonsumsi jamu sebanyak 52,9 % atau sebanyak 18 responden. Dari hasil uji analisis *Chie-square* , diperoleh nilai *Chie-square* , diperoleh nilai $p_{value}) 0,000 < 0,05$.

Kesimpulan: Terdapat hubungan pengetahuan ibu hamil trimester III tentang efek samping jamu dengan perilaku mengkonsumsi jamu di Desa Kerinjing Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang Jawa Tengah

Kata kunci : Pengetahuan, Perilaku Mengkonsumsi Jamu

¹ Mahasiswa STIKES A Yani

² Dosen Pembimbing I

³ Dosen Pembimbing II

RELATIONS PREGNANT MOTHERS IN THE THIRD SEMESTER ABOUT THE SIDE EFFECTS OF HERBS WITH THE CONSUMING BEHAVIOR HERBS

ABSTRACT

Suyatmi¹, Endah Puji A², Ari Sulistyawati³

Background: Medicinal herbs are passed down from our ancestors. Jamu is consumed third trimester pregnant women is herbal peuyang chili. The content of medicinal herbs chilli peuyang is, lempuyang, fennel, pulosari, turmeric, kedawung, keningar, kawak acid. The side effects of consuming herbal third trimester pregnant women is to inhibit labor, amniotic murky, hyper trophic pyloric stenosis, baby asphyxiation. III trimester of pregnancy is a gestational age 7 months to 9 months of pregnancy. Based on a preliminary study of 10 village Keringing third trimester pregnant women there are 5 women who consume herbs. .

Purpose of research: to analyze the relationship of pregnant mothers knowledge in the third semester about the side effects jamu with the behavior consuming jamu in Keringing village.

Research methods: types of research used is analytic survey. That is to see without deliberately treatment to raises a symptomatic condition. The research using cross sectional. A model approach that uses a one-time gathering of data was done quickly. The sampling technique is sampling by taking the whole population.

Research results: The results of the study is the relationship of third trimester maternal knowledge about the side effects is still lacking was 38,2% and the result of the behavior of consuming herbs as much as 52.9% or 18 respondents. From the analysis of the test results-square Chi, Chi-square values obtained, the value of (p_value) $0.04 < 0.05$

Conclusion: there is a knowledge relations pregnant mothers in the third semester about the side effects of jamu with the consuming behavior jamu.

Keywords: Knowledge, Herb Consuming Behavior

¹ Mahasiswa STIKES A Yani

² Dosen Pembimbing I

³ Dosen Pembimbing II