

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan pengetahuan ibu hamil trimester III tentang efek samping jamu dan perilaku konsumsi jamu di Desa Kerinjing, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang Jawa Tengah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagian besar responden merupakan ibu hamil trimester III dengan tingkat pengetahuan kurang tentang efek samping jamu yaitu sejumlah 14 ibu hamil trimester III (38,2%).
2. Sebagian besar responden mengkonsumsi jamu yaitu ada 18 ibu hamil trimester III mengkonsumsi jamu (52,9%).
3. Ada hubungan pengetahuan ibu hamil trimester III tentang efek samping jamu dengan perilaku mengkonsumsi jamu. Hasil uji analisis *chi square* didapatkan hasil nilai X^2_{hitung} sebesar 6,452 dengan sig p_{value} sebesar 0,05. Dengan $df = 2$ dan taraf signifikansi α adalah 5% (0,05) diperoleh $X^2_{tabel} = 5,991$. Karena $X^2_{hitung} > X^2_{tabel}$ dan nilai $p < 0,05$ maka H_0 ditolak.

B. Saran

1. Bagi Tenaga Kesehatan Setempat

Diharapkan tenaga kesehatan khususnya Bidan memberikan penyuluhan mengenai Pengetahuan ibu hamil trimester III yang mengikut sertakan ibu

hamil trimester III dalam memahami tentang perilaku mengkonsumsi jamu, khususnya KIE ke desa mengenai efek samping jamu.

2. Bagi Ibu Hamil

Sebagai masukan ibu-ibu hamil agar lebih hati-hati untuk mengkonsumsi jamu dan dapat memahami efek samping jamu. Untuk kesehatan ibu dan janinnya.

3. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat meneliti faktor-faktor lain, selain pengetahuan yang dapat mempengaruhi perilaku mengkonsumsi jamu, menggunakan jumlah sampel, alat dan metode pengumpulan yang berbeda dengan penelitian yang serupa dengan membandingkan responden yang mengkonsumsi jamu dengan yang tidak mengkonsumsi jamu terhadap efek samping jamu.