

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang lamanya pemakaian KB suntik DMPA dengan kejadian amenorhea yang dilakukan di RB An-Nissa Surakarta pada bulan Desember 2009 - Januari 2010, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mayoritas responden yang menggunakan KB DMPA lebih dari 2 tahun yaitu, sebanyak 59 responden (60,2%).
2. Mayoritas responden mengalami kejadian amenorhea, yaitu sebanyak 60 responden (61,2%).
3. Ada hubungan yang signifikan antara lama pemakaian KB DMPA dengan kejadian *amenorrhea* dengan hasil nilai $\chi^2_{hitung} (29,750) > \chi^2_{tabel} (3,841)$.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Bagi Bidan di RB An-Nissa Surakarta

Sebagai tenaga kesehatan khususnya bidan diharapkan untuk lebih efektif dalam memberikan KIE, khususnya kontrasepsi suntik DMPA sehingga akseptor mengetahui efek samping dari kontrasepsi tersebut dan

dapat memilih kontrasepsi yang cocok atau sesuai sehingga dapat tercapai pelayanan kontrasepsi yang lebih bermutu.

2. Bagi Masyarakat (akseptor KB suntik DMPA di RB An Nissa Surakarta.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah informasi dan wawasan akseptor KB suntik DMPA mengenai efek samping suntik DMPA dapat menyebabkan *amenorhea*.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya serta dapat dikembangkan sebagaimana mestinya.

PERPUSTAKAAN
JENDERAL ACHMAD YANI
STIKES JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA