

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERDARAHAN POSTPARTUM
PADA IBU BERSALIN DI RSUD PANEMBAHAN SENOPATI
BANTUL YOGYAKARTA TAHUN 2011**

INTISARI

Intan Ma'rifatul Ifah Arifin, Sujiyatini , Nendhi Wahyunia Utami

Latar Belakang: Tingginya AKI saat ini masih menjadi masalah besar di Indonesia. Perdarahan pasca persalinan terutama perdarahan postpartum primer merupakan perdarahan yang paling banyak menyebabkan kematian ibu dengan perdarahan setelah anak lahir melebihi 500 ml, pada 24 jam pertama. Pada perdarahan postpartum primer penyebabnya adalah atonia uteri, retensio plasenta, laserasi jalan lahir dan kelainan pembekuan darah.

Tujuan Penelitian: Diketuinya jumlah faktor-faktor penyebab perdarahan postpartum pada ibu bersalin di RSUD Panembahan Senopati Bantul Yogyakarta tahun 2011.

Metode Penelitian: Rancangan penelitian ini adalah analisis deskriptif. Jumlah sampel yang digunakan adalah seluruh populasi yang berjumlah 56 ibu bersalin yang mengalami perdarahan postpartum disebabkan atonia uteri, retensio plasenta, laserasi jalan lahir, kelainan pembekuan darah. Analisa data yang digunakan adalah analisis univariat dengan hasil berupa prosentase (%).

Hasil: Retensio plasenta menjadi faktor utama perdarahan postpartum sebesar 48 (75,0%) kedua ada laserasi jalan lahir 13 (23,2%) ketiga atonia uteri 1 (1,8%) dan untuk faktor kelainan pembekuan darah tidak ditemukan (0%).

Saran: Mengelola sebaik mungkin dalam penanganan kegawat daruratan perdarahan postpartum.

Kata Kunci: Faktor penyebab perdarahan postpartum.

Kepustakaan : Buku 18, Jurnal 2, KTI 3, Internet 4

Halaman : xii, 5 Bab, 45 Halaman, 4 Tabel, 2 Gambar.

**CAUSE FACTORS IN MATERNAL POSTPARTUM
HEMORRHAGE MATERNITY IN HOSPITALS PANEMBAHAN
SENOPATI BANTUL YOGYAKARTA YEAR 2011**

ABSTRACT

Intan Ma'rifatul Ifah Arifin, Sujiyatini, Nendhi Wahyunia Utami

Background: The high AKI is now still be a problem in Indonesia. Bleeding after childbirth especially hemorrhage postpartum primary is bleeding the most widely cause the death of mother with hemorrhage after the child born to exceed 500 mls, on 24 the first hour. Bleeding postpartum on primary factor causing is atonia uteri, retensio the placenta, up a laceration and abnormalities of blood.

Research objectives: Knows the number of factors causing postpartum bleeding in the mother in the maternity hospital of Bantul Yogyakarta Panembahan Senopati in 2011.

Research Methods: The design of this research is descriptive analysis. The number of samples used is the whole population of which is 56 mother of maternity who suffered bleeding caused atonia postpartum uteri, retensio the placenta, up a laceration, an abnormality of blood. Analysis the data used is univariat with the results of the analysis (in the form of prosentase %).

Results: Retensio of the placentae into a major factor hemorrhage postpartum of 48 (75,0 %) a second there are lasesari 13 (23,2 %) third atonia uteri 1 (1.8 %) and to the factors of a disorder of blood clots not found (0%).

Conclusion: Increase of the management emergensi about hemorrhage postpartum.

Keywords : Caused postpartum hemorrhage.

Library : Books 18, Journals 2, KTI 3, Internet 4.

Pages : xii, 5 Bab, 45 Pages, 4 Tabels, 2 Images.