

RELATIONSHIP BETWEEN NUTRITION MOM PREGNANT WITH
ANEMIA IN HEALTH CARE EVENT LEVEL II SLEMAN GODEAN
YOGYAKARTA YEAR 2010

Solistyoningsih¹, Endang Rostiati², Eva Putriningrum³

ABSTRACT

Background: Nutritional status of pregnant women will play an important role in pregnancy on maternal and fetal well, one of the important nutrients during pregnancy are iron. Anemia in pregnant women is largely due to iron deficiency anemia.

Objective: For determine the relationship between nutritional status of pregnant women with anemia at the PHC level Godean II Sleman Yogyakarta Year 2010. Method: Method of using observational research with cross sectional approach. Location of research in PHC Godean II Sleman Yogyakarta Year 2010. The sampling technique using purposive sampling techniques and data analysis using chi squared formula.

Results: showed that the number of respondents who have good nutritional status of as many as 24 respondents (80%), poor nutrition as much as six respondents (20%). The incidence rate of anemia anemic five respondents (16.7%) and did not have anemia as many as 25 respondents (83.3%). Obtain the statistical test results count $\chi^2 = 6.000$ while the χ^2 table = 3.481, p of 0.014.

Conclusion: there is a relationship between nutritional status of pregnant women with anemia at the PHC level Godean II Sleman Yogyakarta Year 2010.

Keywords: Nutritional Status of Pregnant Women, Genesis Anemia

1 Student STIKES A Yani Yogyakarta

2 Lecturer STIKES A Yani Yogyakarta

3 Lecturer STIKES A Yani Yogyakarta

HUBUNGAN ANTARA STATUS GIZI IBU HAMIL DENGAN TINGKAT KEJADIAN ANEMIA DI PUSKESMAS GODEAN II SLEMAN

Solistyoningsih¹, Endang Rostiati², Eva Putriningrum³

INTISARI

Latar Belakang: Tingginya angka kematian maternal dan neonatal masih menjadi masalah nasional. Menurut Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) pada tahun 2005 Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia yaitu 262/100.000 kelahiran hidup (Dinkes RI, 2006). Status Gizi ibu hamil akan sangat berperan dalam kehamilan baik pada ibu maupun janin, salah satu unsur gizi yang penting ketika hamil adalah zat besi. Anemia pada ibu hamil sebagian besar adalah anemia karena kekurangan zat besi. Dari hasil studi pendahuluan ada 10 ibu hamil yang memeriksakan di Puskesmas dan 3 ibu hamil yang mengalami anemia 2 diantaranya mengalami status gizi kurang.

Tujuan: Untuk mengetahui hubungan antara status gizi ibu hamil dengan tingkat kejadian anemia di Puskesmas Godean II Sleman .

Metode Penelitian: Metode penelitian menggunakan *deskriptif analitik* dengan pendekatan *cross sectional*. Lokasi penelitian di Puskesmas Godean II Sleman Yogyakarta. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dan analisa data menggunakan rumus *chi kuadrat*.

Hasil penelitian: menunjukkan bahwa jumlah responden yang memiliki status gizi baik sebanyak 24 responden (80%), gizi kurang sebanyak 6 responden (20%). Tingkat kejadian anemia yang mengalami anemia sebanyak 5 responden (16,7%) dan yang tidak mengalami anemia sebanyak 25 responden (83,3%). Uji statistik di dapatkan hasil X^2 hitung= 6,000 sedangkan X^2 tabel= 3,481, dengan p sebesar 0,014.

Kesimpulan: Ada hubungan antara status gizi ibu hamil dengan tingkat kejadian anemia di Puskesmas Godean II Sleman .

Kata Kunci: Status Gizi Ibu Hamil, Kejadian Anemia

¹ Mahasiswa STIKES A Yani Yogyakarta

² Dosen STIKES A Yani Yogyakarta

³ Dosen STIKES A Yani Yogyakarta